

**ADDOME SUPERIORE:** (fegato, colecisti, vie biliari, reni, pancreas, milza, vasi addominali, etc.).

Nei 2-3 giorni precedenti l'esame assumere 6 compresse di Mylicon al giorno (2 dopo ogni pasto).

Sono da evitare i seguenti alimenti: verdura, latte, latticini, frutta, legumi, e bevande gassate.

N.B.: il giorno dell'esame presentarsi a digiuno (da almeno 6 ore).

**ADDOME INFERIORE:** (utero, ovaie, vescica, prostata, vie urinarie).

Presentarsi a vescica piena e comunque portare con sé una bottiglia d'acqua.

**ADDOME COMPLETO:** nei 2-3 giorni precedenti l'esame assumere 6 compresse di Mylicon al giorno (2 dopo ogni pasto).

Sono da evitare i seguenti alimenti: verdura, latte, latticini, frutta, legumi, e bevande gassate.

Presentarsi a vescica piena e comunque portare con sé una bottiglia d'acqua.

N.B.: il giorno dell'esame presentarsi a digiuno (da almeno 6 ore).

**ALTRI DISTRETTI:** (tiroide, mammella, ginocchio, spalla, etc.) non è necessaria alcuna particolare preparazione.

**IMPORTANTE: PORTARE EVENTUALI ESAMI DIAGNOSTICI PRECEDENTI.**